

Pitanja i literatura za radno mjesto Ljekar specijalista opće hirurgije 10.11.2022.g.

- 1.** 45-godišnja žena dolazi sa slsabošću unutarnjih mišića šake, te slabošću i bolom u šaci. Koji je od sljedećih živaca najvjerojatnije ozlijeden?
- 2.** 68-godišnja žena ima pigmentiranu leziju na trupu. Pri dalnjem ispitivanju lezija ima nepravilan rub, tamniju boju i uzdignutu površinu. Incizijska biopsija je izvedena i potvrđen melanom debljine 0,5 mm. Pacijentu je zakazana široka lokalna ekscizija melanoma u operacijskoj sali. Što je od sljedećeg preporučena najmanja ekscizionala margina?
- 3.** Tinejdžer pada s bicikla i pregazi ga kamion. Po dolasku u Urgentni centar, on je budan i svjestan i djeluje preplašeno, ali nije neposredno respiratorno i hemodinamski životno ugrožen. Radiografija prsnog koša ukazuje na hidrogasne razine u lijevom donjem plućnom polju i čini se da se nazogastrična sonda uvija prema gore u lijevo prsište. Što je od sljedećeg najbolji korak u njegovom liječenju?
- 4.** Desetogodišnji dječak bio je suvozač na stražnjem sjedalu u sudaru motornog vozila pri velikoj brzini. Na prijemu u hitnoj službi, on je budan, svjestan i hemodinamski stabilan. Žali se na bolove u trbuhi i ima ekhimoze na prednjem trbušnom zidu gdje je bio vezan sigurnosni pojas. Što je od sljedećeg najbolji sljedeći korak u njegovom tretmanu?
- 5.** 36-godišnji muškarac kojeg je udario auto dolazi na Urgentni centar s hipotenzijom. Na pregledu, on ima osjetljivost i modrice na lijevoj strani prsa ispod bradavice. Ultrazvučni pregled otkriva slobodnu tekućinu u abdomenu. Koji je organ najvjerojatnije ozlijeden kod ovog pacijenta?
- 6.** 59-godišnja žena ima bol u desnom donjem kvadrantu, mučninu i povraćanje. Podvrgava se nekomplikiranoj laparoskopskoj apendektomiji. Postoperativno, patologija otkriva mucinozni adenokarcinom od 2,5 cm s limfnom invazijom. Pregled stadija, uključujući kolonoskopiju, rendgensko snimanje prsnog koša i kompjutoriziranu tomografiju (CT) abdomena i zdjelice, negativan je. Što je od sljedećeg najprikladniji korak u njenom liječenju?
- 7.** 32-godišnji muškarac s trogodišnjom istorijom ulceroznog kolitisa javlja se na razgovor radi hirurške intervencije. Pacijent je inače zdrav i nema znakova rektalne displazije. Što je od navedenog najprikladnija elektivna operacija za ovog bolesnika?
- 8.** 39-godišnji prethodno zdravi muškarac hospitaliziran je 2 sedmice s epigastričnom bolju koja propagira prema leđima, mučnine i povraćanja. Početne laboratorijske vrijednosti pokazale su povišene vrijednosti amilaza u skladu s akutnim pankreatitisom. Pet sedmica nakon otpusta, žali se na ranu sitost, epigastrična bol i groznica. Na pregledu, njegova temperatura je 38,9°C, a otkucaji srca 120 otkucaja u minutu; njegov broj bijelih krvnih zrnaca (WBC) je 24 000/mm<sup>3</sup>, a vrijednosti amilaza su mu normalne. Učini se CT skeniranje koje pokazuje peripankreatične tečne kolekcije veličine 6 cm sa 6 cm. Što bi od sljedećeg bilo najadekvatniji tretman?
- 9.** Prethodno zdrava 79-godišnja žena osjeća ranu sitost i punoću u trbuhi. CT snimka abdomena, prikazana ovdje, otkriva cističnu leziju u tijelu i repu gušterače. CT vođena aspiracija pokazuje povišene

vrijednosti karcinoembrionalnog antigena (CEA). Koje od sljedećeg je najprikladnija opcija liječenja ovog pacijenta?



**10.** 56-godišnja žena dolazi na pregled otprilike 3 mjeseca nakon učinjene terminalne kolostomije zbog resekcije sigme. Žali se da joj stoma ne funkcioniра kako treba. Koje od sljedećeg je najčešća komplikacija terminalne kolostomije?

**11.** 56-godišnji prethodno zdravi čovjek primjećuje da su mu oči žute i da gubi na težini. Na fizikalnom pregledu pacijent ima žuticu i ikterične bjeloočnice, trbuh je bezbolan. Transkutani ultrazvuk abdomena pokazuje dilataciju bilijarnog stabla bez holelitijaze. Što je od sljedećeg najprikladniji sljedeći korak u obradi ovog pacijenta?

**12.** 45-godišnja žena s istorijom intenzivnog uzimanja nesteroidnih protuupalnih lijekova manifestira se akutnom abdominalnom boli. Podvrgava se eksplorativnoj laparotomiji 30 sati nakon početka simptoma i utvrđeno je da ima perforirani duodenalni ulkus. Što je od sljedećeg izbor za liječenje njenog stanja?

**13.** 45-godišnji muškarac s poviješću hroničnog peptičkog ulkusa podvrgnut je trunkalnoj vagotomiji i antrektomiji s Billroth II rekonstrukcijom. Šest sedmica nakon operacije, vraća se, žali se na postprandijalnu slabost, znojenje, ošamućenost, grčeve u trbuhu bol i proljev. Što bi od sljedećeg bila najbolja početna strategija liječenja?

**14.** 32-godišnji alkoholičar s terminalnim stadijem bolesti jetre primljen je u bolnicu 3 puta zbog krvarenja varikoziteta jednjaka. Prethodno je bio podvrgnut bandažiranju i skleroterapiji. On priznaje da i dalje pije i pored datih savjeta. Na EHO pregledu abdomena ima slobodnu tečnost. Što je od sljedećeg najbolja opcija za dugoročno liječenje varikoziteta jednjaka kod ovog pacijenta?

**15.** Muškarac star 55 godina žali se na hroničnu povremenu epigastričnu bol. Gastroskopija pokazuje prepilorični ulkus od 2 cm. Biopsija ulkusa ne daje maligno tkivo. Nakon 6 sedmica medicinske terapije, ulkus je nepromijenjen. Što je od sljedećeg najbolji korak u njegovom liječenju?

- 16.** Tokom kolonoskopije kod 45-godišnjeg muškarca otkriven je rak hepatalne fleksure debelog crijeva. Pacijent ima anemiju koja zahtijeva transfuziju. Nakon eksploracije abdomena u operacijskoj sali, otkrivena je neočekivana metastaza od 3 cm u rubu desnog režnja jetre. Prije operacije, pacijent je bio savjetovan o ovoj mogućnosti i ostalim hirurškim mogućnostima. Koje od sljedećeg je najprikladnije liječenje ovog pacijenta?
- 17.** 22-godišnji student primjećuje izbočinu u svojoj desnoj preponi. Naglašena je kašljem, ali se lako reducira. Koja od sljedećih kila prati putanju funikularnih struktura unutar sjemene vrpce?
- 18.** 42-godišnji muškarac ima napade povremene grčevite boli u trbuhi i rektalno krvarenje. Kolonoskopija se izvodi i pokazuje višestruke hamartomatozne polipe. Pacijent se uspješno tretira endoskopskim uklanjanjem što je moguće više polipa. Što je od sljedećeg najvjerojatnija dijagnoza?
- 19.** 70-godišnja žena ima mučninu, povraćanja, nadutost u trbuhi i povremene grčeve sa bolom u srednjem dijelu trbuha. Nema povijest prethodnih operacija, ali ima dugu povijest holelitijaze za koju je odbila operaciju. Radiografija njezinog abdomena otkriva sferičnu gustoču u donjem desnom kvadrantu trbuha. Što je od sljedećeg konačno liječenje opstrukcije crijeva ovog pacijenta?
- 20.** 53-godišnji muškarac dolazi Urgentni centar sa bolovima u lijevom donjem kvadrantu trbuha, vrućicom i povraćanjem. CT abdomena i zdjelice otkriva zadebljani sigmoidni kolon s upaljenim divertikulom i tečnom kolekcijom u zdjelici veličine 7 x 8 cm. Nakon perkutane drenaže i liječenje antibioticima, bol i tekućina nestaju. Vraća se ambulantno u kliniku 1 mjesec kasnije na redovnom pregledu. Podvrgava se kolonoskopiji koja pokazuje samo divertikule u sigmoidnom kolonu. Što je od sljedećeg najprikladniji sljedeći korak u liječenju ovog pacijenta?
- 21.** Slučajno je pronađen 47-godišnjoj asimptomatskoj ženi polip žučnjaka od 5 mm i bez kalkuloze na ultrazvučnom pregledu. Što je od sljedećeg najbolja opcija tretiranja?
- 22.** 45-godišnji čovjek doživljava sve bolniju retrosternalnu žgaravicu, osobito u toku noći. Konzumiraо je tablete antacida koje smanjuju tegobe. Ezofagogram pokazuje hijatalnu herniju. U određivanju pravilnog liječenju klizne hijatalne kile, koji od sljedećih je najkorisniji dijagnostički modalitet?
- 23.** 22-godišnja žena je došla u hiruršku ambulantu zbog izbočine u desnoj preponi. Ona negira bol i može učiniti da izbočina nestane ležanjem i stalnim pritiskom na izbočinu. Negira mučninu ili povraćanje. Na pregledu ima reponibilnu kilu ispod desnog ingvinalnog ligamenta. Što je od sljedećeg najprikladnije liječenje ovog bolesnika?
- 24.** 22-godišnja žena ima bolnu fluktuirajuću masu u središnjoj liniji između glutealnih nabora. Negira bolove na rektalnom pregledu. Što je od sljedećeg najvjerojatnija dijagnoza?
- 25.** Tokom apendektomije za akutni apendicitis, tvorevina od 4 cm je pronađena u srednjem dijelu crvuljka. Ex tempore biopsija otkriva da je ova lezija karcinoidni tumor. Što je od sljedećeg:

**Literatura:**

- Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, et al, eds. Schwartz's Principles of Surgery. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2010.
- Doherty GM. Current Surgical Diagnosis & Treatment. 13th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2010.
- Moore EE, Mattox KL, DV Feliciano, et al, eds. Trauma. 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2007.
- Mulholland MW, Lillemoe KD, Doherty GM, et al, eds. Greenfield's Surgery Scientific Principles & Practice. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins; 2011.

Townsend CM Jr, Beauchamp RD, Evers BM, et al, eds. *Sabiston Textbook of Surgery*. 18th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2007.